

Tuesday, April 12, 2016

**ამოცანა N1.** დავუშვათ,  $n$  კენტი ნატურალური რიცხვია, ხოლო,  $x_1, \dots, x_n$  არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვები. დაამტკიცეთ, რომ, თუ  $x_{n+1} = x_1$  მაშინ სამართლიანია უტოლობა:

$$\min(x_j^2 + x_{j+1}^2) \leq \max(2x_i x_{i+1}) \quad \text{სადაც, } j = 1 \dots n \text{ და } i = 1 \dots n.$$

**ამოცანა N2.** ABCD ციკლური ოთხკუთხედაა. AC და BD დიაგონალები იკვეთებიან X წერტილში. ვთქვათ,  $C_1, D_1$  და M წერტილები არიან შესაბამისად CX, DX და CD მონაკვეთების შუაწერტილები.  $AD_1$  და  $BC_1$  წრფეები იკვეთებიან Y წერტილში და MY წრფე კვეთს AC და BD დიაგონალებს შესაბამისად E და F წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ XY წრფე ეხება წრეწირს რომელიც გაივლება E, F და X წერტილებზე.

**ამოცანა N3.** ვთქვათ  $m$  მთელი დადებითი რიცხვია. განვიხილოთ ერთეულოვანი ზომის კვადრატული უჯრებისგან შედგენილი  $4m \times 4m$  ცხრილი. ვიტყვი, რომ ამ ცხრილის ორი განსხვავებული უჯრა ენათესავება ერთმანეთს თუ, ისინი განლაგებულნი არიან ცხრილის ერთსა და იმავე სტრიქონში ან სვეტში. ამასთან, არცერთი უჯრა არ ენათესავება თავის თავს. ამ ცხრილის ზოგიერთი უჯრა ლურჯად შეღებეს, ისე რომ, ცხრილის ყოველი უჯრა ენათესავება მინიმუმ ორ ლურჯ უჯრას. ცხრილის უჯრების რა უმცირესი რაოდენობის შეღებვის შედეგად შეიძლება შესრულებულიყო ეს პირობა.